



الوزارة العامة للصحة
وزارة الصحة - الشؤون الصحية
وزارة الصحة العامة

الثآليل التناسلية عند المرأة

Genital warts

أسباب الثآليل التناسلية:

What is Genital Warts :

تظهر الثآليل التناسلية نتيجة عدوى فيروسية تُعد الأكثر شيوعاً بالجهاز التناسلي.

الأعراض

Symptoms of Genital Warts:

١. ظهور ثآليل مرتفعة أو في مستوى سطح الجلد في الأعضاء التناسلية للجنسين.
٢. وجود حكة في منطقة الشرج، أو الشفرتين.
٣. وجود إفرازات مهبلية زائدة.
٤. نزيف مهبلي بعد الجماع.

الشفرتين، فتحة المهبل، جدار المهبل، عنق الرحم، حول الشرج.

الشفرتين، فتحة المهبل، جدار المهبل، عنق الرحم، حول الشرج.

تشخيص الثآليل التناسلية:

Diagnosis of Genital Warts:

أثناء الكشف الطبي يمكن التعرف بسهولة على المرض إذا كانت الثآليل موجودة في الأعضاء التناسلية الخارجية. أما إذا كانت صغيرة جداً في الحجم وغير مرئية بالعين المجردة فيمكن رؤيتها بوضوح عند استخدام عدسة مكبرة.

طرق علاج الثآليل:

Treatment of Genital Warts:

يتم اختيار الطريقة المناسبة تبعاً لعدة عوامل منها حدة المرض ومكان ظهور الثآليل.

يجب التأكد من علاج الزوج والزوجة معاً وليس أحدهما فقط.

١. العلاج الدوائي:

يتم العلاج الدوائي باستخدام الأدوية.

٢. العلاج الجراحي:

- التجميد بسائل نيتروجيني.
- الكي الكهربائي.
- الليزر.

٣. العلاج بالليزر:

بعد العلاج:

After treatment:

بعد استئصال الثآليل قد يستمر وجود الفيروس عند المريض، وفي بعض الحالات قد يؤدي إلى الإصابة بالثآليل مرة أخرى، لذلك يجب المتابعة المستمرة مع الطبيب حتى إذا بدا للمريض اختفاء الثآليل نهائياً.



www.ngha.med.sa
2020